

Artenliste der im Göttinger und Northeimer Raum nachgewiesenen Vogelarten.

Die Liste enthält 322 Vogelarten, deren Auftreten in der Region seit 1800 dokumentiert ist. Um die Tabelle nicht zu überfrachten, wurde im allgemeinen auf quantitative Angaben verzichtet. Dies gilt auch für Ortsbezeichnungen. Bei tiefergehendem Interesse an der regionalen Avifauna wird, neben den avifaunistischen Jahresberichten 2000-2010, die Lektüre der kommentierten Artenliste (DÖRRIE 2000) empfohlen. Eine Download-Version dieser vergriffenen Publikation kann unter der Mailadresse info@ornithologie-goettingen.de angefordert werden. Im Unterschied zur letztgenannten Veröffentlichung bezieht die Tabelle auch den Südkreis des Landkreises Göttingen (Altkreis Hann. Münden) ein.

Statusangaben Brutvogelarten: **B** = Brutvogel. Als Bruthinweis wird auch die Besetzung eines Gesangsreviers über einen längeren Zeitraum gewertet (vor allem bei Sperlingsvögeln). **uB** = unregelmäßiger Brutvogel in größeren Zeitabständen (bei ein- bis dreimaligem Brüten mit Jahresangabe). **eB** = ehemaliger Brutvogel (regionale Population wegen Habitatverlust und/oder Klimaveränderung erloschen, eine autochthone Wiederansiedlung ist bis auf weiteres unwahrscheinlich).

Statusangaben Gastvogelarten (Heimzug, Übersommerung, Wegzug, Winter): **G** = Gastvogel. **sG** = seltener Gastvogel (bis zu 10 Nachweise). **A** = Ausnahmeerscheinung (bis zu drei Nachweise, einschließlich Jahresangabe).

Die Statusangaben beziehen sich im wesentlichen auf die Zeit nach 1960. Langjährige Trends für einige Brut- und Gastvogelarten werden durch Anfügungen (+ für Zunahme, - für Abnahme) gekennzeichnet. Die Zunahme von Nachweisen ist nicht selten das Resultat besserer Erfassung und sollte deshalb nicht pauschal mit einem positiven Trend gleichgesetzt werden.

Die Liste enthält auch Nachweise von Kuhreiher (freifliegende Population in Hannover) sowie von Gerfalke und Würgfalke (beide häufig als sogenannte Beizvögel gehalten). Ob es sich bei diesen Individuen um Wildvögel gehandelt hat, muss letztlich offenbleiben. Bei den regionalen Kuhreihern und dem Würgfalken - der historische Nachweis des Gerfalcken entzieht sich genauerer Beurteilung - lagen keine direkten Hinweise auf ein Entfleuchen aus Gefangenschaft vor.

Beobachtungen von in der BRD (noch) nicht etablierten Neozoen (z.B. Schwarzschan, Streifengans, Schwarzkopf-Ruderente, Brautente) bzw. Gefangenschaftsflüchtlingen (Kategorien D und E der bundesdeutschen Artenliste) sind in der Zusammenstellung nicht enthalten, ebenso Nachweise von Arten, die sich fern der Region dauerhaft angesiedelt haben, aber hier als Gefangenschaftsflüchtling einzustufen sind (z.B. Halsbandsittich - aber nicht die Mandarinente, die in Niedersachsen frei brütet).

Auch der Jagdfasan fehlt, weil er im niedersächsischen Bergland keine sich selbst erhaltende Population aufweist. Zudem werden Aussetzungen kaum noch vorgenommen.

Zweifelhafte oder in früheren Jahresberichten und anderen Publikationen unzureichend dokumentierte Beobachtungen wurden nicht berücksichtigt.

Vogelart	Status
Entenvögel – Anseriformes	
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B, G
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	G
Zwergschwan <i>Cygnus [columbianus] bewickii</i>	G
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A (1997)
Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	sG
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	G
Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	G
Saatgans	
- Waldsaatgans (<i>Anser f. fabalis</i>)	sG
- Tundrasaatgans (<i>A. f. rossicus</i>)	G
Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i>	sG
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	G +
Graugans <i>Anser anser</i>	B +, G +
Nilgans <i>Alopochen aegyptiacus</i>	B +, G +
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	G +
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	G
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	G
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	B, G
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	G
Krickente <i>Anas crecca</i>	B, G
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B, G
Spießente <i>Anas acuta</i>	G
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	B, G
Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A (1988)
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	B, G
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	G +
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	G (1990 Mischbrut mit Tafelente)
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	uB (zuletzt 1990), G
Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i>	A (1980)
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B +, G
Bergente <i>Aythya marila</i>	G
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	G -
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	G
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	G
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	G
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	G
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	G
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	G
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	G

Vogelart	Status
Hühnervögel – Galliformes	
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B +, G +
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B -
Haselhuhn <i>Bonasia bonasia</i>	eB
Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	eB
Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	eB
Flamingos - Phoenicopteriformes	
Rosaflamingo <i>Phoenicopus ruber</i>	A (1969, 1977, 1979)
Lappentaucher – Podicipediformes	
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B, G
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B, G
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	G
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	G
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	uB (1998), G
Seetaucher – Gaviiformes	
Sternentaucher <i>Gavia stellata</i>	G
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	G
Eistaucher <i>Gavia immer</i>	A (1991, 2010)
Röhrennasen – Procellariiformes	
Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	A (1937, 1987)
Madeirawellenläufer <i>Oceanodroma castro</i>	A (2000)
Kormoranvögel - Phalacrocoraciformes	
Basstölpel <i>Sula bassana</i>	A (1871, 1995)
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	eB, G
Ibisse - Threskiornithiformes	
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A (2011)
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	sG
Reiher - Ardeiformes	
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	G

Vogelart	Status
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	eB, nach 1980 sG
Nachtreiber <i>Nycticorax nycticorax</i>	uB (1863), G +
Rallenreihler <i>Ardeola ralloides</i>	A (1983, 2002)
Kuhreihler <i>Bubulcus ibis</i>	A (1986, 2004)
Silberreihler <i>Casmerodius albus</i>	G +
Graureihler <i>Ardea cinerea</i>	B, G
Purpureihler <i>Ardea purpurea</i>	G
Seidenreihler <i>Egretta garzetta</i>	G

Storchenvögel - Ciconiiformes

Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B +, G
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B +, G

Greifvögel – Accipitriformes

Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	G
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B, G
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	A (2006)
Schelladler <i>Aquila clanga</i>	A (2001)
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	A (1986)
Zwergadler <i>Aquila pennat</i>	A (1998)
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	A (2003)
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	G +
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	uB (1988, 1991), G
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	B, G
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B, G
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B, G
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	B, G
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	B +, G
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	G +
Rauhfußbussard <i>Buteo lagopus</i>	G
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B, G
Merlin <i>Falco columbarius</i>	G
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	G
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B, G
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B +, G
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	A (1850)
Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	A (1991)
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B, G

Kranichvögel – Gruiformes

Kranich <i>Grus grus</i>	G +
--------------------------	-----

Vogelart	Status
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A (1897)
Großtrappe <i>Otis tarda</i>	G
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B, G
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B, G
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	B, G
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	A (1964, 1976)
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	sG
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B, G
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B, G

Wat-, Möwen-, Alkenvögel - Charadriiformes

Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	uB (1994), G
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	A (2000, 2007, 2011)
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	G
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	G
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	G
Tundra - Goldregenpfeifer <i>Pluvialis fulva</i>	A (1974)
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B, G
Steppenkiebitz <i>Chettusia gregaria</i>	A (1986, 1988, 2007)
Weißschwanzkiebitz <i>Chettusia leucura</i>	A (2011)
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B, G
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	G
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	sG
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	sG
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	G
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	G
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	uB (1967), G
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	G
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B -, G
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	G
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	A (1992, 1998, 2007)
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	B, G
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	G
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	sG
Flußuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	uB (1969, 1987), G
Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>	A (2004)
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	G
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	uB (1986), G
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	G
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	G
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	uB (1991, 1995), G
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	G
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	G

Vogelart	Status
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	G
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	G
Grasläufer <i>Tryngites subruficollis</i>	A (1996, 2009)
Knutt <i>Calidris canutus</i>	G
Sanderling <i>Calidris alba</i>	G
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	G
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	G
Wiesenstrandläufer <i>Calidris minutilla</i>	A (1985)
Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>	A (1985, 1990)
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	sG
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	G
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	G
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A (vor 1865, 1979, 1986)
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	sG
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	sG
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	A (1957, 2002, 2006)
Skua <i>Stercorarius skua</i>	A (1963)
Krabbentaucher <i>Alle alle</i>	A (1995)
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	G
Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i>	A (2008, 2009)
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	G
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	B -, G
Aztekenmöwe <i>Larus atricilla</i>	A (2007)
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	G +
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	G
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A (1997)
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	G
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	G
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	G
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	G
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	G
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	G
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>	G
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	G
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	G
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	sG
Flusseeeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	G
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	G +

Flughühner – Pteroclidiformes

Steppenflughuhn <i>Syrnhaptes paradoxus</i>	A (1888)
---	----------

Vogelart	Status
Tauben – Columbiformes	
Straßentaube <i>Columba livia f. domestica</i>	B
Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B, G
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B +, G
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B -
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B -, G -
Kuckucke – Cuculiformes	
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B -, G
Eulen – Strigiformes	
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	B +
Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	eB
Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B +
Waldohreule <i>Asio otus</i>	B, G
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	G
Uhu <i>Bubo bubo</i>	B +
Schneeeule <i>Bubo scandiacus</i>	A (1820, 1924)
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B
Schwalmvögel - Caprimulgiformes	
Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	eB, sG
Segler – Apodiformes	
Alpensegler <i>Apus melba</i>	A (2009)
Mauersegler <i>Apus apus</i>	B +, G
Rackenvögel – Coraciiformes	
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	sG
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B +, G
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	uB (2003), sG
Hopf – und Hornvögel - Upupiformes	
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	eB, G +

Vogelart**Status****Spechtvögel – Piciformes**

Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B -, G
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B +
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B
Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B +
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i>	B

Sperlingsvögel – Passeriformes

Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	uB, G
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	eB, A (1964, 1965, 1978)
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	eB
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B, G
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	B, G
Elster <i>Pica pica</i>	B
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B, G
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B, G
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B, G
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	G -
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	B +, G
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>	G -
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B +
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	B -, G -
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B, G
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B, G
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B, G
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>	B
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B, G
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	eB
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	uB, G
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B, G -
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	G -
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B, G
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B -, G
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	B, G
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	sG
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	uB (2003, 2005), G
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B, G
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B, G
Bartlaubsänger <i>Phylloscopus schwarzi</i>	A (1999)

Vogelart	Status
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B -, G
Zilpzalp	
- Zilpzalp <i>Phylloscopus c. collybita</i>	B, G
- Sibirischer Zilpzalp <i>P. t. tristis</i>	sG
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Phylloscopus proregulus</i>	A (2000)
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A (2005)
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A (1963, 1987)
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B, G
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B, G
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B, G
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	G (bis 1975, 2006)
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B, G +
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B, G
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B, G
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	uB, G +
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B -, G
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B +, G
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B, G
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	A (1962)
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B, G
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B, G
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B, G
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	B, G
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	G
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B, G
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B, G
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B, G
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B, G -
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	A (2001)
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B, G
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	G
Amsel <i>Turdus merula</i>	B, G
Schwarzkehlrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A (vor 1851)
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B +, G
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B, G
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	G
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B, G
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	sG
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B, G
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	A (1966, 1967, 1978)
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B, G
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	uB, G +

Vogelart	Status
Pallassschwarzkehlchen <i>Saxicola maurus</i>	A (2011)
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B, G
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	B, G
Blaukehlchen	
- Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia s. svecica</i>	sG
- Weißsterniges Blaukehlchen <i>L. s. cyanecula</i>	B +, G +
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B, G
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B -, G
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	uB, G
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B, G
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B -
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B -
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A (1994)
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	G
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B -, G
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	B -, G
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	G
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	G
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B, G
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	sG
Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava</i>	B, G
Gelbkopf – Schafstelze <i>Motacilla flavissima</i>	G
Maskenschafstelze <i>Motacilla feldegg</i>	A (1991)
Aschkopf – Schafstelze <i>Motacilla cinereocapilla</i>	A (1996, 1998)
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	B, G
Trauerbachstelze <i>Motacilla yarrellii</i>	sG
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B, G
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	G
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B, G
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B, G
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	sG
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B, G
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pyropsittacus</i>	A (1983)
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B, G
Grünfink <i>Carduelis chloris</i>	B, G
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B, G
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B, G
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B -, G
Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	G -
Birkenzeisig	
- Nördlicher Birkenzeisig <i>Carduelis f. flammea</i>	G
- Alpenbirkenzeisig <i>C. f. cabaret</i>	B +, G
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	sG
Schneeammer <i>Calcarius nivalis</i>	G

Vogelart	Status
Grauammer <i>Emberiza calandra</i>	eB, G
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B, G
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	G
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B, G
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A (1974)
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A (2003)