

Artenliste der im Göttinger und Northeimer Raum nachgewiesenen Vogelarten.

Die Liste enthält 330 Vogelarten/Taxa, deren Auftreten in der Region seit 1800 dokumentiert ist. Um die Tabelle nicht zu überfrachten, wurde im Allgemeinen auf quantitative Angaben verzichtet. Dies gilt auch für Ortsbezeichnungen. Bei tiefer gehendem Interesse an der regionalen Avifauna wird, neben den avifaunistischen Jahresberichten 2000-2010 und den Sammelberichten auf dieser Homepage, die Lektüre der Kommentierten Artenliste (DÖRRIE 2000) empfohlen. Im Unterschied zur letztgenannten Veröffentlichung bezieht die Tabelle auch den Südkreis des Landkreises Göttingen (Altkreis Hann. Münden) ein.

Statusangaben Brutvogelarten: **B** = Brutvogel. Als Bruthinweis wird auch die Besetzung eines Gesangsreviers über einen längeren Zeitraum gewertet (vor allem bei Sperlingsvögeln). **uB** = unregelmäßiger Brutvogel in größeren Zeitabständen (bei ein- bis dreimaligem Brüten mit Jahresangabe). **eB** = ehemaliger Brutvogel.

Statusangaben Gastvogelarten (Heimzug, Übersommerung, Wegzug, Winter): **G** = Gastvogel. **sG** = seltener Gastvogel (bis zu 10 Nachweise). **A** = Ausnahmerecheinung (bis zu drei Nachweise, einschließlich Jahresangabe).

Die Statusangaben beziehen sich im Wesentlichen auf die Zeit nach 1960. Langjährige Trends für einige Brut- und Gastvogelarten werden durch Anfügungen (+ für Zunahme, - für Abnahme) gekennzeichnet. Die Zunahme von Nachweisen einiger Durchzügler ist nicht selten das Resultat besserer Erfassung und sollte deshalb nicht pauschal als Ergebnis eines positiven Brutbestandstrends (z.B. Brachpieper) interpretiert werden.

Die Liste enthält auch Nachweise von Kuhreiher (frei fliegende Population in Hannover) sowie von Gerfalke und Würgfalke (beide häufig als so genannte Beizvögel gehalten). Ob es sich bei diesen Individuen um Wildvögel gehandelt hat, muss letztlich offen bleiben. Bei den regionalen Kuhreihern und dem Würgfalken - der historische Nachweis des Gerfalcken entzieht sich genauerer Beurteilung - lagen keine direkten Hinweise auf ein Entfleuchen aus Gefangenschaft vor.

Beobachtungen von in der BRD (noch) nicht etablierten Neozoen (z.B. Schwarzschan, Streifengans, Schwarzkopf-Ruderente, Brautente) bzw. Gefangenschaftsflüchtlingen (Kategorien D und E der bundesdeutschen Artenliste) sind in der Zusammenstellung nicht enthalten, ebenso Nachweise von Arten, die sich fern der Region dauerhaft angesiedelt haben, aber hier als Gefangenschaftsflüchtling einzustufen sind (z.B. Halsbandsittich - aber nicht die Mandarinente, die in Niedersachsen frei brütet).

Auch der Jagdfasan fehlt, weil er im niedersächsischen Bergland keine sich selbst erhaltende Population aufweist. Zudem werden Aussetzungen kaum noch vorgenommen. Ein Bartgeier („Scadella“) aus dem Schweizer Auswilderungsprojekt, der 2012 auf einem Hausdach im Landkreis Northeim saß, fällt wie andere Projektvögel in Kat. E. Über die Herkunft von zwei (unberingten) Rothalsgänsen, die im März/April 2015 im Landkreis Northeim rasteten, kann, weil die Begleitumstände eher untypisch waren (z.B. keine nordischen Gänse als Kumpane) nur spekuliert werden. Daher fehlen sie in dieser Aufstellung. Dies trifft auch auf eine Zwerggans zu, die sich im Dezember 2014 zusammen mit acht Rostgänsen im Landkreis Northeim aufhielt.

Ein paar aktuelle Beobachtungen ausgenommen, die der Beurteilung harren, sind alle Seltenheiten seit ca. 1980 von den zuständigen Kommissionen anerkannt. Zweifelhafte oder in früheren Jahresberichten und anderen Publikationen unzureichend dokumentierte Beobachtungen wurden nicht berücksichtigt.

Göttingen, den 7.6.2016 H. Dörrie und C. Grüneberg.

Vogelart

Status

Entenvögel – Anseriformes

Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B, G
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	G +
Zwergschwan <i>Cygnus [columbianus] bewickii</i>	G
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A (1997)
Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	sG
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	G +
Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	G +
Saatgans	
- Waldsaatgans <i>Anser fabalis fabalis</i>	sG
- Tundrasaatgans <i>A. f. rossicus</i>	G +
Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i>	sG
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	G +
Graugans <i>Anser anser</i>	B +, G +
Nilgans <i>Alopochen aegyptiacus</i>	B +, G +
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	G +
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	G
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	G
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	B, G
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	G
Krickente <i>Anas crecca</i>	B, G
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B, G
Spießente <i>Anas acuta</i>	G
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	B, G
Blauflügelente <i>Anas discors</i>	A (1988)
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	B, G
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	G +
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	G (1990 Mischbrut mit Tafelente)
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	uB (zuletzt 1990), G
Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i>	A (1980)
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B +, G
Bergente <i>Aythya marila</i>	G
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	G -
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	G
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	G
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	G
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	G
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	G
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	G
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	G +

Hühnervögel – Galliformes

Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B +, G +
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B -
Haselhuhn <i>Bonasia bonasia</i>	eB
Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	eB
Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	eB

Flamingos - Phoenicopteriformes

Rosaflamingo <i>Phoenicopus ruber</i>	A (1969, 1977, 1979)
---------------------------------------	----------------------

Lappentaucher – Podicipediformes

Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B, G
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B, G
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	G
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	G
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	uB (1998), G

Seetaucher – Gaviiformes

Sternentaucher <i>Gavia stellata</i>	G
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	G
Eistaucher <i>Gavia immer</i>	sG

Röhrennasen – Procellariiformes

Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	A (1937, 1987, 2013)
Madeirawellenläufer <i>Oceanodroma castro</i>	A (2000)

Kormoranvögel - Phalacrocoraciformes

Basstölpel <i>Sula bassana</i>	A (1871, 1995)
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	eB, G +

Ibisse - Threskiornithiformes

Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A (2011, 2013)
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	sG

Reiher - Ardeiformes

Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	G
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	eB, G +
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	uB (1863), G +
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	A (1983, 2002, 2012)
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	A (1986, 2004)
Silberreiher <i>Casmerodius albus</i>	G +
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	B, G
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	G
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	G +

Storchenvögel - Ciconiiformes

Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B +, G
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B +, G

Greifvögel – Accipitriformes

Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	G
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B, G
Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	A (2013)
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	sG
Schelladler <i>Aquila clanga</i>	A (2001)
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	A (1986)
Zwergadler <i>Aquila pennat</i>	A (1998)
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	A (2003)

Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	A (2014, 2015)
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	G +
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	uB (1988, 1991), G
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	B, G
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B, G
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B, G
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	B, G
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	B +, G
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	G +
Rauhfußbussard <i>Buteo lagopus</i>	G
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B, G
Merlin <i>Falco columbarius</i>	G
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	G
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B, G
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B +, G
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	A (1850)
Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	A (1991)
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B, G

Kranichvögel – Gruiformes

Kranich <i>Grus grus</i>	G +
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A (1897)
Großtrappe <i>Otis tarda</i>	G
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B, G
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B, G
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	B, G
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	uB (2007), A (1964, 1976)
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	sG
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B, G
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B, G

Wat-, Möwen-, Alkenvögel - Charadriiformes

Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	uB (1994), G
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	sG
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	G
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	G
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	G
Tundra - Goldregenpfeifer <i>Pluvialis fulva</i>	A (1974)
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B -, G
Steppenkiebitz <i>Chettusia gregaria</i>	A (1986, 1988, 2007)
Weißschwanzkiebitz <i>Chettusia leucura</i>	A (2011)
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B, G
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	G
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	sG
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	G
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	G
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	G
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	uB (1967), G
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	G
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B -, G
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	G
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	A (1992, 1998, 2007)
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	B, G
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	G

Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	sG
Flußuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	uB (1969, 1987), G
Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>	A (2004)
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	G
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	uB (1986), G
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	G
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	G
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	uB (1991, 1995), G
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	G
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	G
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	G
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	G
Grasläufer <i>Tryngites subruficollis</i>	A (1996, 2009)
Knutt <i>Calidris canutus</i>	G
Sanderling <i>Calidris alba</i>	G
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	G
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	G
Wiesenstrandläufer <i>Calidris minutilla</i>	A (1985)
Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>	A (1985, 1990)
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	sG
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	G
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	G
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A (vor 1865, 1979, 1986)
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	G
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	sG
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	sG
Skua <i>Stercorarius skua</i>	A (1963)
Krabbentaucher <i>Alle alle</i>	A (1995)
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	G
Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i>	A (2008, 2009)
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	G
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	B -, G
Aztekenmöwe <i>Larus atricilla</i>	A (2007)
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	G +
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	G
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A (1997)
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	G
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	G +
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	G +
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	G
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	G
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	G
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	A (2015)
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>	G +
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	G +
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	G
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	sG
Flusseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	G
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	G +

Flughühner – Pteroclidiformes

Steppenflughuhn <i>Syrhaptes paradoxus</i>	A (1888)
--	----------

Tauben – Columbiformes

Straßentaube <i>Columba livia f. domestica</i>	B
Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B +, G
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B +, G
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B -
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B -, G -

Kuckucke – Cuculiformes

Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B -, G
--------------------------------	--------

Eulen – Strigiformes

Schleiereule <i>Tyto alba</i>	B
Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	eB
Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B +
Waldohreule <i>Asio otus</i>	B, G
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	G
Uhu <i>Bubo bubo</i>	B +
Schneeeule <i>Bubo scandiacus</i>	A (1820, 1924)
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B

Schwalmvögel - Caprimulgiformes

Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	eB, sG
---	--------

Segler – Apodiformes

Alpensegler <i>Apus melba</i>	A (2009)
Mauersegler <i>Apus apus</i>	B -, G

Rackenvögel – Coraciiformes

Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	sG
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B +, G
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	uB (2003, 2014), G

Hopf – und Hornvögel - Upupiformes

Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	eB, G +
------------------------------	---------

Spechtvögel – Piciformes

Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B -, G
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B +
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B
Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>	B +
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i>	B

Sperlingsvögel – Passeriformes

Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	uB, G
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	eB, A (1964, 1965, 1978)
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	eB

Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B, G
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	B -, G
Elster <i>Pica pica</i>	B
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B, G
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B, G
Dohle <i>Corvus monedula</i>	B, G
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	G -
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	B +, G
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>	G -
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B +
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	B -, G -
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B, G
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B, G
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B, G
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>	B
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	B, G
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	eB
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	uB, G
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B, G -
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	G -
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B, G
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B -, G
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	B, G
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	sG
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	uB (2003, 2005), G
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B, G
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B, G
Bartlaubsänger <i>Phylloscopus schwarzi</i>	A (1999)
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B -, G
Zilpzalp	
- Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B, G
- Taigazilpzalp <i>P. c. tristis</i>	sG
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Phylloscopus proregulus</i>	A (2000)
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	A (2005, 2013)
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A (1963, 1987)
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B -, G
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B, G
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B +, G
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	G (bis 1975) A (2006, 2014)
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B, G +
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B -, G
Buschrohrsänger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	A (2014)
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B, G
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	uB, G +
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B -, G
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B +, G
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B, G
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	A (1962, 2014)
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B, G
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B +, G
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B, G
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	B, G
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	G
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B, G
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B, G

Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B, G
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B, G -
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	A (2001)
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B, G
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	G
Amsel <i>Turdus merula</i>	B, G
Schwarzkehdrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A (vor 1851)
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B +, G
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B, G
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	G
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B, G
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	sG
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B -, G
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	sG
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B -, G
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	B +, G +
Pallasschwarzkehlchen <i>Saxicola maurus</i>	A (2011)
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B, G
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	B +, G
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	A (2016)
Blaukehlchen	
- Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia svecica svec.</i>	sG
- Weißsterniges Blaukehlchen <i>L. s. cyanecula</i>	B +, G
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B, G
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B -, G
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	uB, G
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B, G
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B -
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B -, G
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A (1994)
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	G
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B -, G
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	B -, G
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	G
Strandpieper <i>Anthus petrosus</i>	sG
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	G
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B, G
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	sG
Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava</i>	B +, G
Gelbkopf – Schafstelze <i>Motacilla flavissima</i>	G
Maskenschafstelze <i>Motacilla feldegg</i>	A (1991)
Aschkopf – Schafstelze <i>Motacilla cinereocapilla</i>	A (1996, 1998)
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	B, G
Trauerbachstelze <i>Motacilla yarrellii</i>	sG
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B, G
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	G
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B, G
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B, G
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	sG
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B -, G -
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pyropsittacus</i>	A (1983)
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B, G
Grünfink <i>Carduelis chloris</i>	B, G
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B, G

Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	B, G
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>	B -, G
Berghänfling <i>Carduelis flavirostris</i>	G -
Birkenzeisig	
- Taigabirkenzeisig <i>Carduelis flammea flammea</i>	G
- Alpenbirkenzeisig <i>C. f. cabaret</i>	B +, G
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	G
Schneeammer <i>Calcarius nivalis</i>	G
Grauammer <i>Emberiza calandra</i>	eB, G
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B, G
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	G
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B, G
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A (1974)
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A (2003)